المركبات الأروماتية

الدكتور مهند عامر

كلية تربية عبري

٢٠٠٥/٢٠٠٦

الهيدروكربونات الأروماتية

المركبات الأروماتية هي :
عبارة عن مركب حلقي مستوي الشكل

البنزين ومركبات الألكين

المتشكلات المتوقعة للبنزين

4 isomers expected for
Kekulé benzene

Benzene $\xrightarrow{\text{Br}_2/\text{FeBr}_3}$ **3 isomers**

3 isomers expected

اشكال الرنين في البنزين

...today we recognize the two structures Kekulé drew as simple **resonance forms**.

The conjugated system in the benzene ring results in the formation of a **continuous π -cloud**, above and below the plane of the ring.

An electrostatic potential map of benzene showing enhanced electron density above and below the ring plane.

توزيع إلكترونات حسب الأفلاك الجزيئية

The six p-orbitals of benzene combine to form six π -molecular orbitals of increasing energy.

The six bonding electrons occupy the three lowest energy molecular orbitals.

Calculated shapes for
the π -molecular
orbitals of benzene...

البناء الأروماتي

تفسير بناء البنزين بالطنين

اشكال الطنين هي تخيلية وليست حقيقية

- البناء الحقيقي للبنزين بناء واحد غير متغير التهجين وهو شكل مدمج لهيات الطنين كما هو مبين في الشكل .

تفسير بناء البنزين بالطنين

- بناء الطنين يختلف فقط في مواقع الإلكترونات . مواقع الذرات لا تتغير من بناء طنين وآخر
- في البنزين , ذرات الكربون الستة تكون شكل سداسي الأضلاع والزوايا , الكترونات باي π تتشارك بشكل متساوي فيما بينها . جميع روابط كربون - كربون طولها متساوٍ = (1.39 Å) , وهي بين طول روابط $C-C = 1.54 \text{ \AA}$ و $C=C (1.34 \text{ \AA})$

الظاهرة الأروماتية

- تحتوي على $(4n + 2)$ الكتروناً على شكل أفلاك π (2,6,10,... الخ) في الحلقة
- تحتوي على سحابة من الكترونات π
- مركبات أكثر استقراراً

$4n + 2$ Rule

2,3-Dimethylcyclobutadiene

Planar...
4 π electrons,
therefore **not aromatic** (*antiaromatic*)

$4n + 2$ Rule

4 π electrons
antiaromatic

Benzene

Planar...
6 π electrons,
therefore **aromatic**

$4n + 2$ Rule

4 π electrons
not aromatic

6 π electrons
aromatic

Cyclooctatetraene

Not planar...
8 π electrons,
therefore **not aromatic**

Cyclooctatetraene

$4n + 2$ Rule

4 π electrons
not aromatic

6 π electrons
aromatic

8 π electrons
not aromatic

Cyclopentadienyl Anion

Planar...
6 π electrons,
therefore **aromatic**

$4n + 2$ Rule

4 π electrons
not aromatic

6 π electrons
aromatic

8 π electrons
not aromatic

6 π electrons
aromatic

Cycloheptatrienyl Cation

Planar...
6 π electrons,
therefore **aromatic**

$4n + 2$ Rule

4 π electrons
not aromatic

6 π electrons
aromatic

$4n + 2$ Rule

$4n + 2$ Rule **Adenine** **Uracil**

$4n + 2$ Rule

Adenine:
10 π electrons
Aromatic

$4n + 2$ Rule

Adenine:
10 π electrons
Aromatic

The lone pairs on the nitrogens are **orthogonal** to the π -system and do not participate in the π -molecular orbital.

$4n + 2$ Rule

Adenine:
10 π electrons
Aromatic

$4n + 2$ Rule

Adenine:
10 π electrons
Aromatic

Uracil:
6 π electrons
Aromatic

تسمية المركبات الأروماتية

اسماء شائعة تستخدم كما هي :

toluene

phenol

anisole

aniline

benzaldehyde

benzoic acid

xylene

cresol

IUPAC. جميعها مقبولة حسب قواعد الأيوباك

بعض المركبات الأروماتية عديدة الحلقات

naphthalene

anthracene

phenanthrene

اوجد اسم الأصل

- نستخدم كلمة البنزين فقط للحلقة

bromobenzene

اوجنا اسم الاصل

- نستخدم البنزين فقط للحلقة
- وتستخدم هنا الاسماء الشائعة

bromobenzene

2,4,6-trinitrotoluene

سم البدائل

- مثلما ذكرنا سابقاً

bromobenzene

سم البدائل

- مثلما ذكرنا سابقاً
- في حالة وجود بديلين نستخدم الكلمات التالية للمواقع
ortho, meta, para

bromobenzene

para-chloroaniline

Ortho, meta, & para

ortho

meta

para

سؤال 1

(a)

(b)

(d)

سؤال 1

(a)

ortho-xylene

(b)

ortho-nitrotoluene

(d)

3-bromo-5-chlorotoluene

سم المركبات التالية طبقا لقواعد أيوباك ؟

4-bromo-1,2-dimethylbenzene

4-bromo-1,2-dimethylbenzene

1-chloro-3-methylbenzene *or*
3-chlorotoluene

4-bromo-1,2-dimethylbenzene

1-chloro-3-methylbenzene *or*
3-chlorotoluene 1-methyl-4-nitrobenzene *or*
4-nitrotoluene

سم المركبات التالية طبقا لقواعد أيوباك ؟

2-chloro-1-ethyl-4-nitrobenzene

2-chloro-1-ethyl-4-nitrobenzene **1-chloro-2-ethyl-4-nitrobenzene**

2-chloro-1-ethyl-4-nitrobenzene

1-chloro-2-ethyl-4-nitrobenzene

4-chloro-2-ethyl-1-nitrobenzene

سم المركبات التالية كمشتقات للتولوين ؟

2-chloro-4-nitrotoluene

2-chloro-4-nitrotoluene **2-chloro-5-nitrotoluene**

2-chloro-4-nitrotoluene

2-chloro-5-nitrotoluene

5-chloro-2-nitrotoluene

Would you predict cyclodecapentaene to be an aromatic compound?

...consider the geometry of the two central hydrogens.

Cyclodecapentaene

Would you predict cyclodecapentaene to be an aromatic compound?

Cyclodecapentaene

Steric repulsion between the opposing hydrogens forces the π system out of planarity, therefore the molecule is not aromatic.

Azulene, $C_{10}H_8$, is a deep blue hydrocarbon with a large dipole magnetic moment.

- is azulene aromatic using the Hückel definition?**
- utilize resonance forms for azulene to explain the large dipole moment.**

Azulene, $C_{10}H_8$, is a deep blue hydrocarbon with a large dipole magnetic moment.

- is azulene aromatic using the Hückel definition?**
- utilize resonance forms for azulene to explain the large dipole moment.**

10 π -electrons
Aromatic

The two major (neutral) resonance forms for azulene...

The two major (neutral) resonance forms for azulene...

“cyclopentadiene
anion-like”

“cycloheptatriene
cation-like”

...and the **very stable** Zwitterionic form.

Account for the differences in reactivity between pentalene (an unknown compound) and the well-known pentalene dianion:

**8 π -electrons;
not aromatic**

**10 π -electrons;
aromatic**

Reactions of Aromatic Sidechains

1. Oxidation with neutral MnO_4^-

$\text{MnO}_4^-/\text{H}_2\text{O}, \text{heat}$ $\text{MnO}_4^-/\text{H}_2\text{O}, \text{heat}$ $\text{MnO}_4^-/\text{H}_2\text{O}, \text{heat}$

**Oxidation with
Neutral MnO_4^-**

MnO₄⁻/H₂O, heat

MnO₄⁻/H₂O, heat

MnO₄⁻/H₂O, heat

**...benzylic carbon
must have at least
one hydrogen.**

$\text{MnO}_4^- / \text{H}_2\text{O}$, heat

$\text{MnO}_4^- / \text{H}_2\text{O}$, heat

$\text{MnO}_4^- / \text{H}_2\text{O}$, heat

$\text{MnO}_4^- / \text{H}_2\text{O}$, heat

$\text{MnO}_4^- / \text{H}_2\text{O}$, heat

$\text{MnO}_4^- / \text{H}_2\text{O}$, heat

Dissolving Metal Reduction of Benzene Derivatives The Birch Reduction

Dissolving Metal Reduction of Benzene Derivatives The Birch Reduction

With substituted arenes, the Birch Reduction will proceed to place the double bond on a ring carbon which is attached to **electron donating substituents...**

Dissolving Metal Reduction of Benzene Derivatives The Birch Reduction

Dissolving Metal Reduction of Benzene Derivatives The Birch Reduction

Predict the products of the following reactions.

Predict the products of the following reactions.

Predict the products of the following reactions.

$\text{MnO}_4^-/\text{H}_2\text{O}$

Li/NH_3

Predict the products of the following reactions.

Organic Chemistry OnLine ©2000

تفاعلات الإحلال محل

نوع الإحلال محل " الكتروفيلي "

- الإلكتروفيل يحل محل ذرة الهيدروجين في الحلقة البنزينية

تفاعلات الهلجنة

معدن الحديد أو هاليد الحديد يستخدم كعامل مساعد وهي تساعد الهالوجين ليسلك سلوك الإلكتروليت (E^+)

ميكانيكية التفاعل

تفاعل السلفنة

أبخرة حمض الكبريتيك المشبعة بـ SO_3 في H_2SO_4 .
 حمض الكبريتيك يلعب دور العامل المساعد لتكوين
 SO_3H^+ كإلكتروفيل جيد

ميكانيكية تفاعل السلفنة

تفاعل النترنة Nitration

حمض النيتريك في حمض الكبريتيك لإنتاج الكترول فيل
ثاني اكسيد النيتروجين NO_2^+

ميكانيكية تفاعل النترنة

تفاعل الأسايل Acylation

ميكانيكية تفاعل الأسايل

تفاعل الألكلة Alkylation

ميكانيكية تفاعل الألكلة